

Trajtimi i dislipidemive 1

Strategjitë e ndërrhyrjes sipas nivelit të riskut të përgjithshëm KV dhe nivelit të LDL-C.

Risku i përgjithshëm KV (SCORE) %		Niveli i LDL-C					
		< 55 mg/dl	< 70 mg/dL	70 deri në < 100 mg/dL	100 deri në < 116 mg/dL	116 deri në < 190 mg/dL	> 190 mg/dL
Parandalimi Primar	< 1	Ndërrhyrje në stilin e jetesës	Ndërrhyrje në stilin e jetesës	Ndërrhyrje në stilin e jetesës	Ndërrhyrje në stilin e jetesës	Ndërrhyrje në stilin e jetesës, merrni në konsideratë barnat nëse nuk kontrollohet	Ndërrhyrje në stilin e jetesës dhe ndërrhyrje e menjëhershme me barna
	1 - <5	Ndërrhyrje në stilin e jetesës	Ndërrhyrje në stilin e jetesës	Ndërrhyrje në stilin e jetesës	Ndërrhyrje në stilin e jetesës, merrni në konsideratë barnat nëse nuk kontrollohet	Ndërrhyrje në stilin e jetesës, merrni në konsideratë barnat nëse nuk kontrollohet	Ndërrhyrje në stilin e jetesës dhe ndërrhyrje e menjëhershme me barna
	> 5 deri në < 10, ose risk i lartë	Ndërrhyrje në stilin e jetesës	Ndërrhyrje në stilin e jetesës	Ndërrhyrje në stilin e jetesës, merrni në konsideratë barna*	Ndërrhyrje në stilin e jetesës dhe ndërrhyrje e menjëhershme me barna	Ndërrhyrje në stilin e jetesës dhe ndërrhyrje e menjëhershme me barna	Ndërrhyrje në stilin e jetesës dhe ndërrhyrje e menjëhershme me barna
Parandalimi Sekondar	≥ 10 ose risk shumë i lartë	Ndërrhyrje në stilin e jetesës	Ndërrhyrje në stilin e jetesës	Ndërrhyrje në stilin e jetesës dhe ndërrhyrje e menjëhershme me barna	Ndërrhyrje në stilin e jetesës dhe ndërrhyrje e menjëhershme me barna	Ndërrhyrje në stilin e jetesës dhe ndërrhyrje e menjëhershme me barna	Ndërrhyrje në stilin e jetesës dhe ndërrhyrje e menjëhershme me barna
	Risk shumë i lartë	Ndërrhyrje në stilin e jetesës, merrni në konsideratë barna*	Ndërrhyrje në stilin e jetesës dhe ndërrhyrje e menjëhershme me barna	Ndërrhyrje në stilin e jetesës dhe ndërrhyrje e menjëhershme me barna	Ndërrhyrje në stilin e jetesës dhe ndërrhyrje e menjëhershme me barna	Ndërrhyrje në stilin e jetesës dhe ndërrhyrje e menjëhershme me barna	Ndërrhyrje në stilin e jetesës dhe ndërrhyrje e menjëhershme me barna


*Në pacientët me infarkt të miokardit duhet të merret në konsideratë terapia me statina pavarësisht niveleve të LDL-C.

Shkurtesa: KV: kardiovaskular; LDL-C: LDL kolesteroli

*Në pacientët me infarkt të miokardit duhet të merret në konsideratë terapia me statinë na pavarësisht niveleve të LDL-C.

Shkurtesa: KV: kardiovaskular; LDL-C: LDL kolesteroli

Trajtimi i dislipidemive 2



*Burrat < 55 dhe gratë < 65 vjeç, tek të afërmit e shkallës së parë.
 I Statinaj janë terapi e vijës së parë por mund të nevojitet një terapi shtesë ose alternative sipas Algoritmit.
 II Konsideroni synime më agresive për pacientët e diagnostikuar rishtas me sindromë koronare akute.

**Inhibitorët e PCSK9 nuk janë studiuar mjaftueshëm si terapi shtesë ndaj statinave për pacientët me diabet dhe sëmundje të tjera bashkëshoqëruese; apoB: apolipoproteina B, BAS: sekuestruesit e acidit biliar; BMI: indeksi i masës trupore, SKV, sëmundja kardiovaskulare, HDL-C: HDL kolesteroli